


A lush green meadow with tall grasses and scattered purple flowers. The text is overlaid in the center.

# **Prawidłowe użytkowanie siedlisk przyrodniczych**



**Siedlisko przyrodnicze – miejsce posiadające cechy sprzyjające występowaniu określonych grup roślin i zwierząt oraz specyficzne:**

- ukształtowanie powierzchni
- warunki wodne
- warunki glebowe



warianty siedliskowe  
Programu  
Rolnosiedliskowego

**(z zastosowaniem kryteriów  
NATURA 2000)**

## Wariant 2.1. Mechowiska

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7230 Torfowiska zasadowe o charakterze

młak, turzycowisk i mechowisk

Torfowiska źródliskowe

**Torfowiska zasadowe o charakterze  
młak, turzycowisk i mechowisk**















**koszenie w terminie od 15 lipca 30 września w sposób nie niszczący powierzchni gleby – wysokość koszenia 5-15 cm**

- pozostawienie 50% powierzchni nie skoszonej**
- usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg po skoszeniu**
- zakaz koszenia dośrodkowego**
- zakaz wypalania i nawożenia**

**Wariant 2.1.**  
**szuwary wielkoturzynowe**

**7219-1 Torfowiska nakredowe**

**- ekstensywny wypas lub koszenie**



**kłóć wiechowata**



**marzyca czarniawa**



**szuwary wielkoturzycowe**










turzyca zastrzona



- 
- koszenie w terminie od 15 lipca do 30 września, wysokość 5-15 cm
  - coroczne koszenie tylko 20% powierzchni
  - raz na 5 lat dopuszcza się koszenie całego areału
  - usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg po skoszeniu
  - zakaz koszenia dośrodkowego
  - wypasanie w terminie 2 tyg po ustąpieniu wody do 15 października.
  - obsada zwierząt nie większa niż 0,2 DJP/ha/rok

## Wariant 2.3

Łąki trzęślicowe i selernicowe

6410 zmiennowilgotne łąki trzęslicowe





**Kosaciec syberyjski**



**Nasieżał pospolity**



**Goździk pyszny**

**koszenie jesienią po przekwitnięciu i  
wysianiu nasion, w odstępie 2-5 lat**

- wysokość koszenia powyżej 10 cm**
- usunięcie pokosu**
- utrzymanie optymalnego uwilgotnienia**





**łąki selernicowe w dolinach dużych rzek**

Selernica żyłkowana

czosnek kątowy



Konitrut łąkowy



**koszenie w połowie lub pod koniec czerwca  
w nieregularnych odstępach czasu, zależnie  
od zalewów powodziowych**

**- wysokość koszenia 5-10 cm ponad  
powierzchnią**

**- utrzymanie zmiennego poziomu wody**

# Wariant 2.4 . Murawy ciepłolubne

6120 Ciepłolubne śródlądowe  
murawy napiaskowe



## wypas ekstensywny o małym obciążeniu



# 6210 Murawy kserotermiczne





storczyk kukawka



dzwonek syberyjski




łan ostnicy powabnej



goździk kartuzek



- 
- koszenie w terminie od 15 lipca do 30 września**
- wysokość koszenia 5-10 cm ponad powierzchnią
  - wysokość koszenia do 10 cm
  - pozostawienie 15-20% powierzchni nie skoszonej, wymiennie na całym areale
  - Usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg. po koszeniu
  - zakaz koszenia dośrodkowego
  - wypas od 1 maja do 15 października przy obsadzie 0,4 – 0,6 DJP/ha
  - zakaz nawożenia

**Wariant 2.5**

**Półnaturalne łąki wilgotne**

Łąka: rdestowo-ostrożeńiowa i ostrożeńiowa





łąka pełnikowa





łąka kaczyńcowa




firletka poszarpana





Kukuřka plamista



- 
- koszenie w terminie od 15 czerwca nie więcej niż 2 pokosy w roku
  - wysokość koszenia 5-15 cm nad powierzchnią
  - pozostawienie 5-10% powierzchni nieskoszonych
  - usunięcie pokosu w terminie do 2 tyg. po koszeniu
  - zakaz koszenia dośrodkowego
  - wypasanie wolne lub kwaterowe od 21 lipca do 15 października, przy obsadzie zwierząt nie większej niż 1 DPJ/ha
  - zakaz nawożenia azotem powyżej 60kg/ha w ciągu roku

# Wariant 2.6

## Półnaturalne łąki świeże

Łąka rajgrasowa



jastrun pospolity



bodziszek łąkowy



rajgras wyniosły





**jednoroczne, maksymalnie dwukrotne wykaszanie w ciągu roku. 1 pokos w 1 połowie czerwca, 2 pokos we wrześniu**

**- nawożenie obornikiem oraz ograniczone nawożenie fosforowe**

**- usunięcie pokosu**

**- co kilka lat wykaszanie późne (sierpień, wrzesień)**

mozaika siedlisk





**Dziękuję za uwagę**

